

Opis	Nasiona pomidora	Nasiona ogórka	Nasiona sałaty siewnej (typu Batavia)	Nasiona rzodkiewki
Wysiew wewnątrz	• Od lutego do kwietnia. • Głębokość wysiewu ok. 0,2 cm. Jedynie lekko przykryć podłożem. • Wysiewać zachowując duże odstępy między nasionami. • Zapewnić dużą ilość światła.	• Od lutego do kwietnia. • Głębokość wysiewu ok. 1-2 cm. • Wysiewać zachowując duże odstępy między nasionami (ok. 4 cm). • W każdym dołku umieścić cztery nasionka.	• Od lutego do kwietnia. • Przykryć bardzo cienką warstwą podłoża. • Wysiewać zachowując duże odstępy między nasionami.	• Od połowy marca do początku września. • Głębokość wysiewu ok. 0,5-1 cm. Jedynie lekko przykryć podłożem.
Kielkowanie	• Przy temp. 20-22°C po 8-10 dniach.	• Przy min. 10°C po 1-2 tygodniach. Temp. optymalna 24°C.	• Przy temp. 10-16°C po 6-15 dniach. • Wyższe temperatury mogą zahamować kiełkowanie.	• Przy temp. 8-15°C po 8-10 dniach.
Pikowanie	• Gdy liściec jest widoczny. • Dalsza uprawa przy temp. 16-20°C.	• Gdy liściec jest widoczny.	• Gdy liściec jest widoczny.	• Gdy liściec jest widoczny.
Przesadzanie na zewnątrz	• Od połowy maja. • Najpierw uodpornić, zabezpieczyć przed przymrozkami. • Zasadzić przy drabince/kijku. • 50 cm odstępu między roślinami, 80 cm odstępu między rzędami.	• Od połowy maja. • Najpierw uodpornić, zabezpieczyć przed przymrozkami. • 30 cm odstępu między roślinami, 100 cm odstępu między rzędami.	• Od połowy maja. • Przesadzić niezbyt głęboko. • 30 cm odstępu między roślinami, 30 cm odstępu między rzędami.	• Od połowy maja. • 6-8 cm odstępu między roślinami, 15-20 cm odstępu między rzędami.
Miejsce	• Słoneczne i ciepłe, osłonięte od wiatru. • Gleba o dużej miąższości, luźna, próchnicza i równomiernie wilgotna. • Średnie/duże zapotrzebowanie na nawóz, regularnie nawozić.	• Nasłonecznione lub półcieniste, osłonięte pd wiatru. • Ciepła, próchnicza, luźna gleba. • Obficie nawozić i podlewać.	• Możliwie słoneczne. • Luźna, próchnicza gleba. • Nawozić z rozważą. Sałata jest wrażliwa na działanie soli.	• Możliwie słoneczne. W środku lata półcieniste. • Luźna, próchnicza gleba. • Niewielkie zapotrzebowanie na nawóz.
Zbiór	• Od sierpnia.	• Ok. 80 dni po wysiewie. • Pierwsze owoce zbierać wcześnie, aby roślina mogła w pełni wykorzystać swoją energię do wykształcenia kolejnych owoców.	• Gdy tylko urośnie zbita główka.	• 3-8 tygodni od wysiewu. • Zbyt małe odstępy między roślinami oraz brak wody powodują szybkie pękanie rzodkiewek.